



Comunicado

**Campaña de vacunación antigripal 2021 en el marco de la campaña de vacunación
contra Covid-19**

Objetivos de la campaña de vacunación antigripal 2021

1. Disminuir el riesgo de otras infecciones respiratorias en el contexto de la pandemia por la COVID 19.
2. Evitar infección y casos graves en poblaciones de mayor riesgo para virus influenza.
3. Actualizar esquemas de vacunación atrasados de las vacunas que integran el Programa Nacional de Vacunaciones.
4. Evitar aglomeraciones en centros de salud para el cumplimiento de la campaña antigripal.

Generalidades

Se realizará una campaña de vacunación escalonada, comenzando por personal de salud y los grupos no priorizados o que no tienen indicación de vacuna contra SARS CoV-2. Se desarrollará en vacunatorios regulares del Programa Nacional de Vacunaciones, tanto públicos como privados de todo el país y en los que se instalen para esta campaña.

El personal de salud será vacunado en sus lugares de trabajo, como se ha realizado en campañas antigripales anteriores.

Se utilizarán los vacunatorios del plan regular para la vacunación de niños/niñas y embarazadas, con el objetivo de utilizar las oportunidades para actualizar las demás vacunas del esquema regular.

La vacunación antineumocócica 23 valente de las personas que tengan indicación no se realiza durante la campaña y está disponible durante todo el año.

Se debe respetar el intervalo mínimo de 14 días con la vacuna contra SARS CoV-2.



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD Coordinación de Campaña Antigripal

Escalonamiento de los grupos priorizados.

La vacunación por grupos priorizados tendrá una apertura escalonada:

- 26/04 se abre la vacunación para el personal de salud. La misma se desarrollará en sus instituciones de trabajo.
- 3/05 se abre vacunación para:
 - niños de 6 meses a 4 años y 11 meses.
 - embarazadas y puérperas hasta 6 meses de recién nacido, pueden vacunarse en la maternidad aprovechando la oportunidad de la vacunación BCG del recién nacido, para administrar la vacuna antigripal a la madre.

Con cada niño se puede vacunar un adulto que haya cumplido 14 días de la vacunación contra la Covid- 19.

Los próximos grupos a vacunarse, lo que se comunicará oportunamente por vías oficiales, serán:

- niños de 5 a 18 años con comorbilidades.
- personal de servicios esenciales (policías, militares, bomberos)
- Docentes
- ELEPEM
- Personas privadas de libertad (PPL)
- Vacunación para personas de 75 años o más.
- Vacunación para personas de 65 años o más.
- Vacunación a población general.

La vacunación es **gratuita** y se llevará a cabo en los puestos de vacunación públicos y privados de todo el país. **No se requiere receta.**

Consideraciones para las personas que acudan a los vacunatorios.

- *Se exhorta a tomar todas las precauciones necesarias para mantener la distancia prudencial de 2 metros y evitar aglomeraciones.*



- *El uso de tapabocas es obligatorio según recomendaciones vigentes*
- *El personal de los vacunatorios debe mantener el resto de medidas de prevención y protección ya emitidas por el MSP.*
- *La vacuna antigripal debe estar distanciada por lo menos 14 días de una dosis de vacuna contra Covid 19.*

Registro del acto vacunal

Todo acto vacunal debe registrarse en el Sistema Informático de Vacunas (SIV), no es necesario entregar sticker ni carné.

Se deben registrar a través de la campaña antigripal 2021 seleccionando la población objetivo correspondiente. Se recuerda que en caso de error de registro todos los usuarios del sistema deben corregirlo hasta 24 horas después de la administración de la vacuna.

La calidad del dato depende del correcto registro en SIV.

Consideraciones técnicas para la vacunación antigripal.

La vacuna antigripal de la temporada 2021 contiene tres cepas inactivadas de virus influenza, formulada según la recomendación de la OMS para este invierno en el hemisferio sur:

Cepas Virus Influenza Tipo A:

- A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09 (cepa análoga: A/Victoria/2570/2019, IVR-215)
- A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) - cepa análoga (A/Hong Kong/2671/2019, IVR-208)

Cepas Virus Influenza Tipo B:

- B/Washington/02/2019- cepa análoga (B/Washington/02/2019) tipo salvaje.

Está especialmente recomendada en:

- personas de 65 y más años de edad,



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD Coordinación de Campaña Antigripal

- personal de la salud, incluidos estudiantes de todas las áreas salud y cuidadores o acompañantes de enfermos,
- personal de servicios esenciales: policías ejecutivos, bomberos y militares,
- Docentes
- personas de 5 años y más con enfermedades crónicas, priorizando los portadores de las siguientes patologías:
 - EPOC, enfisema y asma moderada a severa.
 - Obesidad severa: Índice de Masa Corporal igual o mayor a 40.
 - Cardiopatías: cardiopatías congénitas, cardiopatía reumática y cardiopatía isquémica.
 - Diabetes insulino dependiente con co-morbilidad asociada: cardiopatía, nefropatía, neuropatía, etc.
 - Personas inmunocomprometidas: pacientes con VIH, neoplasias, enfermedades renales o hepáticas crónicas, uso prolongado de medicamentos inmunosupresores. Se incluyen las personas convivientes con estos pacientes.
 - Enfermedades hematológicas.
 - Enfermedades neuromusculares severas que impiden un manejo adecuado de las secreciones. Se incluyen también niños o adolescentes que han recibido terapia con ácido acetilsalicílico y puedan desarrollar el Síndrome de Reye luego de la infección por el virus de la influenza.
- embarazadas (cualquier etapa del embarazo) durante el período de la campaña (puede administrarse junto a vacuna dpaT),
- mujeres durante los primeros 6 meses post-parto, promoviendo la vacunación de las puérperas previo al alta de la maternidad (puede administrarse junto a vacuna dpaT si ésta no se recibió antes),
- niños de 6 meses a 4 años de edad inclusive.

Contraindicaciones:

- menores de 6 meses de edad,
- personas con alergia grave (anafilaxia) comprobada frente a algún componente de la vacuna (ovoalbumina, proteínas de pollo, neomicina, formolado, oxtocinol 9, tiomersal; así como a sus excipientes: cloruro de sodio, fosfato di sódico deshidratado, fosfato mono potásico, cloruro de potasio) o anafilaxia previa a cualquier vacuna de la gripe.

Precauciones:

- personas con alergia comprobada al huevo,
- personas con Síndrome de Guillain Barre o que lo hayan padecido en las 6 semanas posteriores a la administración de una dosis de vacuna antigripal, en



inmunodeprimidos y portadores de trastornos de la coagulación, se aconseja consultar previamente al médico,

- en caso de enfermedad febril en curso debe postergarse su administración.

No constituyen contraindicaciones y pueden vacunarse aquellas personas en las siguientes situaciones:

- infecciones de las vías aéreas superiores,
- asma u otras manifestaciones atópicas,
- nacimiento prematuro o historia de ictericia al nacimiento,
- historia familiar de convulsiones,
- tratamiento con antibióticos o tratamiento con corticoides a bajas dosis,
- enfermedades crónicas,
- enfermedades neurológicas no evolutivas: parálisis cerebral, entre otras,
- personas portadores de Síndrome de Down.

PAUTA DE ADMINISTRACIÓN:

Niños de 6 meses a 8 años de edad: Si se vacuna por primera vez debe recibir 2 dosis separadas por un intervalo de 1 mes. Si fue vacunado el año anterior recibirá una sola dosis.

- De 6 a 35 meses de edad: 0,25 ml/dosis
- De 36 meses de edad en adelante: 0,5 ml/dosis.

Niños de 9 años y más, adolescentes y adultos: Recibirán una única dosis de 0.5 ml/dosis.

VÍA DE APLICACIÓN: intramuscular.

ALMACENAMIENTO: Mantener a temperatura de 2 a 8º C. No congelar. Proteger de la luz.

Una vez abiertos los frascos multidosis pueden conservarse por 1 semana; respetando la cadena de frío.

Interacción con la vacunación contra la Covid-19:

El intervalo mínimo entre cualquiera de las vacunas contra la Covid-19, la vacuna antigripal y cualquier otra vacuna es de 14 días.

Las personas que estén cursando la Covid 19 o sean contactos y estén en cuarentena deben estar de alta médica para poder concurrir al vacunatorio.



Ministerio
de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
Coordinación de Campaña Antigripal

Notificación de efectos adversos.

Cualquier evento adverso tras la vacunación antigripal puede notificarse al Sistema Nacional de Farmacovigilancia por el siguiente enlace: <https://primaryreporting.who-umc.org/Reporting/Reporter?OrganizationID=UY>

Dra. Alicia Fernández
Coordinadora de Campaña Antigripal